



โพลีออกอกเกิดจากเชื้อไวรัส
เด็งกี (Dengue) ที่มีพาหะคือ
ยุงลาย ผู้ที่เคยป่วยแล้ว
สามารถเป็นซ้ำได้หากได้รับ
เชื้อต่างชนิดกัน




- มีไข้สูงลอย 39 - 40 องศา 2 - 7 วัน
- ปวดเมื่อยตามตัว
- คลื่นไส้อาเจียน
- มีผื่นตามตัว
- ร้องจากภาวะ:
เลือดจัน อาจมี
อาการแทรกซ้อน
เช่น ไตวาย
ตับอักเสบ
- เกิดเลือดต่ำ
เลือดออกง่าย
อาเจียนเป็นเลือด

โรคที่เสียดอกไปไม่มีจำเพาะ
ใช้วิธีรักษาตามอาการ

- กินยาลดไข้ (ใช้พาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน) และเช็ดตัว
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่มีอาการ ทานน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่
- หากมีไข้เกิน 3 วัน และมีอาการช็อก ให้รีบนำส่ง สภ. โดยทันที

- ปากมีรูปร่างทแยง ใช้ยากากกินถุง
สวปใส่เสื้อผ้าให้ขัดขีด ขอบในถุง
หรือติดถุงสวด
- 
- จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ปิดปากภาชนะ
เก็บน้ำให้ขัดขีด ทำลาย
ภาชนะไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขัง
ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมี



ที่มา: สถาบันวิจัยโกลด์มันน์ ulla นานา
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ยุงลาย
ฆาตกรตัวร้าย
ใกล้ตัวคุณ





พาหะนำโรคอันตราย มาพร้อมกับ (ยุงตัวร้าย)

- 1. ยุงก้นปล่อง**
"โรคมาลาเรีย"


- 2. ยุงลาย**
"โรคไข้เลือดออก ,
ชัณคุนคุนยา"


- 3. ยุงเสือ**
"โรคเท้าช้าง"


- 4. ยุงรำคาญ**
"โรคไข้สมองอักเสบ"






อาการ

ໄປຢ້ຽມຢາມພະພິມ
 ປະຕິພາບ ພະພິມ
 ປະຕິພາບ ພະພິມ

มีเกาะชื่อคลองไผ่ลด
มีอู่ท่าเรือ ชีพจรเบา
บดขยี้



มีเพียง จุดบดง
บ้างตามลัดตัว บบพบบ
หรือถ้าขอจจาระดำ

ตัดใบไม้ **หมักจนเน่า**
ปูละเลน้ำขี้เถ้า


ด้วยความปราณัติจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว



ไขเลื้อยตลอดกาล
อันตรายถึงชีวิต



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
โทร 034-997064
WWW.THUANGBUA.GO.TH



โรคไข้เลือดออก
Denque Fever

โรคไข้ซิกา
Zika Fever

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
chikungunya fever

www.thansettakij.com


THANSETTAKIJ

ยุงลายตัวร้าย มาพร้อมฝน

ป้องกันห่างไกลไข้เลือดออก

โรคชิคุนกุนยา VS โรคไข้เลือดออก 'เช็กให้ชัด' ต่างกันอย่างไร?

ชิคุนกุนยา	ไข้เลือดออก
ไข้สูงอย่างเฉียบพลัน	ไข้สูงลอย
ตาแดง มีผื่นแดง	ผื่นแดงจำนวนมาก
ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดเมื่อยน้อยกว่า
ไม่มีเกล็ดเลือดต่ำจนเลือดออก	เกล็ดเลือดต่ำ มีเลือดออก
รักษาตามอาการ พักผ่อนให้เพียงพอ	รับพบแพทย์ทันที ถ้ามีอาการ



ป้องกันลูกน้อยจากโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อไวรัสเด็งกี่ที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะ เมื่อคนถูกยุงกัดจะได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่อาจจะพบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที่ถึงจะนำไปสู่การเสียชีวิต

อาการ

- ไข้สูง ปวดตามตัว อ่อนแอ นอนหลับ ซึม
- รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ปวดท้อง
- อาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ
- อาการหนักจน มีภาวะช็อก และเสียชีวิต

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

- กำจัดทิวากาลแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- นอนในมุ้ง ทายากันยุง
- ควรไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์



โรคไข้เลือดออก

คนที่มีเหงื่อออกมาก

คนที่ตัวร้อน (อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง)

คนที่หายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวดึงดูดยุง

ผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน

เด็ก มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะผิวหนัง

คนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม

7 เคล็ดลับง่ายๆ ป้องกันยุงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

- กระเทียม** เอาอยู่: กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนที่ไล่ยุงได้ดี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- พริกไทยดำ** ยุงก็ยี้: พริกไทยดำมีกลิ่นฉุนที่ไล่ยุงได้ดี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- จุดเทียนหอม**: กลิ่นหอมจากเทียนหอมไล่ยุงได้ดี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- ใส่เสื้อผ้าฝ้าย**: ผ้าฝ้ายมีรูพรุนที่ช่วยให้ลมผ่านได้ดี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- กินวิตามิน B1**: วิตามิน B1 ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง**: ยุงลายวางไข่ในน้ำขัง... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
- อยู่ใกล้พัดลม**: พัดลมช่วยไล่ยุงได้ดี... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ลองนำวิธีใส่ถุงเท้าแบบใหม่ไปใช้ดูก็ได้ เป็นชุดที่ใส่จากธรรมชาติ รับรองความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า

ASTVผู้จัดการ InfoGraphics www.manager.co.th